Autor publikacji:
Zbigniew Rzywucki, firma R-Ceram.



www.doskonaleniegolebir-ceram.pl
email: golebie@r-ceram.pl

Publikacje związane

- ✓ *Podstawy żywienia gołębi.*
- ✓ *Ocena kału gołębi.*
- ✓ *Wodnisty kał, biegunka- zwiastun problemów w hodowli.`*
- ✓ *Kokcydioza – pasożytnicza choroba jelit. Profilaktyka i leczenie choroby.*
- ✓ *Sprawność układu oddechowego oraz przegląd działań zwiększających wydolność lotową gołębi.*
- ✓ *Przegląd wskaźników kondycji i formy lotowej gołębi.*
- ✓ *Wpływ sprawności układu odporności organizmu na stan zdrowia i witalność gołębi.*
- ✓ *Wademekum produktów PANTEX HOLLAND*

Wprowadzenie do publikacji,


Pośród hodowców panuje przekonanie, że najistotniejszym wyznacznikiem, jakości gołębi są jego wyniki lotowe. Także wiadome jest, że na wyniki lotowe, oprócz samych gołębi znaczny wpływ mają też inne, związane z hodowlą czynniki.
W publikacji położono szczególny nacisk na opis charakterystycznych cech i zachowań gołębi, które wskazują na ich stan zdrowia i formę lotową. Hodowla gołębi pocztowych, tak jak każdy inny proces, posiada swoje charakterystyczne cechy, które można obserwować, sprawdzać, nadzorować oraz sterować.
Tak jak w każdym innym procesie, ilość zauważonych zachowań gołębi jest pojęciem umownym i zależy głównie od doświadczenia i spostrzegawczości hodowcy.

Pośród hodowców powszechnie panuje przekonanie, że najistotniejszym wyznacznikiem, jakości gołębi są jego wyniki lotowe. Niepodważalnym jest także stwierdzenie, że hodowla gołębi pocztowych, tak jak każdy inny proces posiada swoje charakterystyczne cechy, które można obserwować, sprawdzać, nadzorować i sterować. Tak jak w każdym innym procesie, ilość zauważonych zachowań gołębi jest pojęciem umownym i zależy głównie od doświadczenia i spostrzegawczości hodowcy. Tylko od doświadczenia hodowcy także zależy, które z poniżej omawianych cech najbardziej pasuje do monitorowania hodowli. Jako przykład takiego podejścia opiszę kilka cech formy lotowej, które powiązane są z ogólnym wyglądem i zachowaniem gołębi.

Ogólny widok gołębia.

Ocena polega na obserwacji charakterystycznych, widocznych cech u gołębi, które opisane są na Rys.1.
W ocenie tej bardzo ważna jest bieżąca obserwacja samego zachowania się gołębi.
Ocenę zaleca się przeprowadzać w ramach codziennych prac w hodowli.

Rys 1. Umiejscowienie widocznych i charakterystycznych cechy u gołębi.



Stan mostka, ocena podbrzusza.

Poprzez rozchylenie piór w okolicy mostka, jak na rysunku 2, uwidacznia się czysta część naskórka, która ukazuje stan mięśni pod-brzusznych (ich kolor oraz ukrwienie). U gołębi, u których wszystkie procesy przemiany materii i funkcjonowania organizmu przebiegają prawidłowo, mięśnie podbrzusza są barwy różowej. U gołębi, które są w optymalnej formie fizycznej, można zauważyć małą podskórną ruszającą się plamkę umiejscowioną wzdłuż mostka. Efekt ten jest bardzo oczekiwany przez każdego hodowcę.

Wygląd mostka: Akceptowany



Wygląd mostka: Nieakceptowany



Rysunek 2. Ocena mostka i mięśni podbrzusza.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora publikacji /Zbigniew Rzywucki, firma R-CERAM/Kod…/28.01.2019 /Strona. 1

W wielu przypadkach hodowca po analizie mostka i oceny podbrzusza potrafi trafnie przewidzieć potencjalne możliwości gołębi wkładanych na lot.


Umięśnienie i waga gołębia.

Powszechnie uznaje się, że umięśnienie oraz waga gołębia zaliczane są do grupy cech związanych z procesem karmienia. Monitorowanie tych cech zawsze wspomaga hodowcę w przygotowaniu fizycznym gołębi. Cechy te określają także szybkość regeneracji organizmu gołębi po ekstremalnym wysiłku.

Obserwacje wagi oraz postępy w regeneracji muskulatury gołębi pozwalają pogłębić wiedzę hodowcy dotyczącą zasad karmienia, stosowania odpowiedniej karmy, w zależności od długości lotu czy warunków lotowych. Wielu hodowców nagminnie popełnia błędy przekarmienia i zatłuszczenia gołębi. Ostatecznie gołębie, w takich przypadkach są za ciężkie i rzadko osiągają znaczące wyniki.

Pośród hodowców panuje powszechne przekonanie, że „tłusty gołąb, mocno zajedzony gołąb, to leniwy gołąb", który rzadko o czasie powraca do gołębnika.

W profesjonalnym podejściu do lotowania gołębi stosuje się różne metody oceny wagi gołębi. Ogólnie znane są informacje o instalowaniu w gołębniku, w indywidualnych celach automatycznych wag, które na bieżąco analizują przyrosty masy gołębi. Jedną z prostszych i praktycznych metod oceny wagi gołębi jest ocena szacunkowa, w rękach hodowcy. W praktyce metoda ta jest bardzo skuteczna, nawet w przypadkach, kiedy obarczona jest błędem. Ważne jest, aby wagę gołębi, oceniać po nocnym spoczynku, przed karmieniem.



Znane są też przypadki, że niejednokrotnie w tym samym miejscu i czasie mierzona jest temperatura gołębi, poprzez pomiar temperatury nóżek. Całość wyników pomiarów monitorowana jest w systemie komputerowym.

PRZEGLĄD WSKAŹNIKÓW WSKAZUJĄCYCH NA OPTYMALNĄ KONDYCJI I FORMĘ LOTOWĄ GOŁEBI.

Tabelaryczne zestawienie wskaźników.

Wskaźniki oceny kondycji i formy lotowej.	Efekt pozytywny, oczekiwany przez hodowcę.	Efekt negatywny, zwiastujący potencjalny problem.
Wygląd ogólny gołębia.		
Upierzenie ogólne, pióra okrywowe gołębia. *Ocena wizualna, Ocena w rękach.*	*Upierzenie staje się bardziej połyskliwe.* *Pióra układają się bardziej ściśle, w taki sposób, że gołębie wyglądają, jakby były znacznie mniejsze niż normalnie.* *Podczas trzymania, gołębie wyślizgują się z ręki.*	
Upierzenie głowy, szyi. *Ocena wizualna,*	*Upierzenie na głowie staje się bardziej spoiste, pióra bardziej lśniące. Głowa wygląda, że jest znacznie mniejsza jak normalnie.* *Otwory uszne są zakryte.*	*W przypadku, kiedy zauważymy:* *Nastroszone pióra w okolicy oczu, przy nosówkach, gołe uszy, oraz nastroszone pióra na szyi". Jest to wyraźny sygnał, że gołąb potencjalnie nie jest zdolny do osiągnięcia oczekiwanych wyników.* *W przypadku, kiedy stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas, należy dokładnie przeanalizować inne, pozostałe wskaźniki oraz zachowanie innych gołębi..* *Podstawowe przyczyny: Potencjale problemy z infekcją układu oddechowego, infekcja innych chorób, lub inwazja pasożytów skóry i upierzenia.* *Pierzenie: znaczna utrata upierzenia szyi, goła szyja .* *Podstawowe przyczyny: Efekt normalnego pierzenia, lub przedawkowania witamin. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot.*
Puch. *Ocena wizualna,*	*Wyraźnie widoczne oznaki zrzucania puchu. Puch widoczny we wszystkich miejscach przesiadywania gołębi, oraz widoczny na odchodach.* *Bardzo widoczny efekt w środkowej części tygodnia, po kąpieli lub po zwiększeniu dawki karmy.* *Bardzo widoczny efekt po przeprowadzeniu efektywnej kuracji oczyszczającej organizm z chorobotwórczych patogenów.*	*Brak widocznych oznak puchu, w miejscu przebywania gołębi.* *Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii, infekcja chorobo-twórcza lub robaczyca.* *Zbyt szybko i nadmiernie zrzucany puch, pióra.* *Podstawowe przyczyny: przedawkowaniem witamin, stosowanie nieprawidłowej dawki preparatów, przekarmienie lub nieprawidłowa kompozycja karmy.*
Oczy (*barwa i wygląd oka)* *Ocena wizualna,*	*Kolor oczu jest błyszczący,. Bardziej intensywny (głębszy w odcieniu) niż normalnie. Rogówki są śnieżono białe lub w innym odcieniu, ale o wyrazistym kolorze.* *Oczy są bardziej ruchliwe, nienerwowe. Widać częste zamykanie i otwieranie powiek. Źrenice są ruchome "czujne"*	*Oczy smutne, bez wyrazistego koloru, Rogówki w około oczu ciemniejsze. Oczy są przymykane podobnie jak dla pozycji czuwania, snu. Zazwyczaj takie gołębie nie są w stanie osiągnąć znaczących wyników lotowych.*

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora publikacji /Zbigniew Rzywucki, firma R-CERAM/Kod…/28.01.2019 /Strona. 2

	nie mylić z nerwowym zachowaniem.	*Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii lub infekcja chorobotwórcza, robaczyca.*
Stan mostka i podbrzusza. *Ocena wizualna, Ocena w rękach poprzez dotyk.*	*Po odsłonięciu upierzenia w okolicy mostka, można zauważyć: miniaturową plamkę (kroplę, często zwaną- żywą rtęcią, przemieszczająca się z jednej na drugą stronę. Mostek mało widoczny a kolor skóry mostka jest różowo-czerwony, aksamitny o znaczącym ukrwieniu. Skóra na lewej i prawej stronie mostka jest wolna od skaz, gorąca, naprężona z widocznymi czerwonymi krwistymi żyłkami.*	*Miniaturowa plamka rozwarstwia się lub całkowicie zanika. Widać szeroki zarys mostka. Powierzchnia skóry jest o sinym kolorze, z widocznymi plamami, wzgórkami. Efekt ten wskazuje niską formę lub brak formy u gołębi. Zazwyczaj, gołębie te nie są w stanie osiągnąć optymalnych wyników lotowych. Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii, infekcja chorobo-twórcza lub robaczyca. Sine mięśnie wskazywać może na zbyt bogatą w białko karmą.*
Waga gołębia. *Ocena wizualna, Ocena szacunkowa w rękach*	*Po powrocie z lotu, podczas kolejnych dni tygodnia widać wyraźnie wzrastającą regenerację mięśni, oraz lekki przyrost wagi w okresie: pomiędzy przylotem z lotu, środkiem tygodni, a wkładaniem gołębi do następnego lotu.*	*Brak wyraźnej regeneracji mięśni, niska i stała waga bez oznak jej przyrostu. Wąski, ostry mostek, oraz wyraźnie zapadnięte wole. Gołębie takie nie są w stanie osiągnąć znaczących wyników lotowych. Nie nadają się do lotu. Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii, infekcja chorobotwórcza, lub zarobaczenie.*
Muskuły, umięśnienie. *Ocena wizualna, Ocena w rękach poprzez dotyk.*	*Są wyczuwalnie napięte. Nie są zbyt mocno odstawione. Przy delikatnym ugięciu skrzydeł, w miejscu łączenia się z ramieniem, wyczuwa się wyższą temperaturę, oraz uczucie wilgoci. U gołębi zauważalne jest lekkie drżenie mięśni.*	
Wygląd nóg. *Ocena wizualna,*	*Nogi są czerwone, wykazują na mocne ukrwienie. Skóra nóg jest ściśle przylegająca i elastyczna. Nogi są czyste, nie widać przylepionego kału do nich.*	*Nogi blade, czasami w odcieniu "sinym". Skóra nóg mocno złuszczona i często oblepiona odchodami. Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii, infekcja chorobotwórcza, brak żelaza w organizmie, inwazja świerzbowców, insektów krwiopijnych. Oznaka anemii.*
Temperatura nóg, *Ocena w rękach, Ocena poprzez dotyk.*	*Nogi po uchwyceniu w ręce, wyraźnie wyczuwalna wyższa temperatura. Nogi u ocenianego gołębia są znacznie cieplejsza, w porównaniu z innymi gołębiami.*	*Zimne nogi, wyczuwalna niska temperatura, są chłodne (biorąc pod uwagę, że normalna temperatura gołębi wynosi około 41^0C.) Podstawowe przyczyny: zaburzenie przemiany materii lub infekcja chorobotwórcza. Słabe ukrwienie, dotlenienie organizmu.*
Stan wola. *Ocena wizualna, Ocena w rękach, poprzez dotyk.*	*Po nocnym spoczynku, wole jest puste, nie wyczuwa się w nim resztek niestrawionej karmy. Wole w mlekiem w okresie karmienia piskląt to dobra pozycja dla samic, ale w przypadku chłodniejszych niż normalnie dni.*	*Po nocnym spoczynku wole jest pełne, niestrawiona karma. Gołębie takie potencjalnie nie są w stanie osiągnąć znaczących wyników. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot. Podstawowe przyczyny: zaburzenie procesu trawienia i wchłaniania pokarmu, zaburzenia przemiany materii lub infekcja chorobotwórcza.*
Stan i kolor nosówki. *Ocena wizualna, Ocena poprzez dotyk.*	*Nosówki (woskówki) są śnieżnobiałe. Nosówki u zdrowych gołębi sprawiają wrażenie, że są twarde. Po naciśnięciu nie odkształcają się.*	*Nosówki (woskówki) są sino-białe, ciemne.(Stan taki nie mylić z gołębiami karmiącymi młode). Po naciśnięciu nosówki odkształcają się. Gołębie nie sa w optymalnej formie, nie są w stanie osiągnąć znaczących wyników. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot. Podstawowe przyczyny. Zaburzenie przemiany materii, infekcja układu oddechowego lub inna przyczyna, należy przeanalizować.*
Dziób. *Ocena wizualna,*	*Dziób mocny, suchy, ciemny o jaśniejszym ostrym zakończeniu.*	
Drożność otworów nosowych. *Ocena wizualna,*	*Otwory nosowe udrożnione, bez oznak wycieków śluzu.*	*Otwory nosowe zapchane, oznaki wycieków śluzu. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot. Podstawowe przyczyny: infekcja układu oddechowego lub inna przyczyna.*
Stan przegrody nosowej. *Ocena wizualna,*	*Przegroda nosowa widoczna na dużej powierzchni, cienka. Ubarwienie wokoło przegrody w kolorze różowy, jest wolne od wydzieliny i widocznych nalotów, sinych przebarwień.*	*Przegroda nosowa jest bardzo mała lub kompletnie zasklepiona. Ubarwienie wokoło przegrody w kolorze sinym, czasami z punktowymi nalotami. Prawdopodobnie gołębie takie nie są w stanie osiągnąć znaczących wyników. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot. Podstawowe przyczyny: infekcja układu oddechowego lub inna przyczyna.(Analiza)*
Ogólne	*W czasie ruchu gołębie wykazuje oznaki szczególnej*	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora publikacji /Zbigniew Rzywucki, firma R-CERAM/Kod…/28.01.2019 /Strona. 3

zachowanie się. *Ocena wizualna,*	*żywotności. Wyczuwalne są u nich oznaki wewnętrznego podniecenia.* *Gołąb jest bardzo ruchliwy i walczący pomiędzy innymi gołębiami w zespole. Wykazuje chęci dominacji nad zespołem.* *Gołąb zajmuje dogodne miejsce do spoczynku i obserwacji zachowania całego stada.*	
Zachowanie się gołębi.(W zespole lotowym)		
Karmienie i pojenie. *Ocena wizualna,*	*Gołębie wykazują chęć do jedzenia i picia, mają ciągle apetyt, walczą o dogodną pozycję w karmiku.* *Gołębie nie są łapczywe i nie są zachłanne w jedzeniu. Po krótkim zaspokojeniu głodu i pragnienia, same opuszczają karmik, aby odfrunąć na miejsce spoczynku.* *Gołębie regularnie, o ustalonej porze powracają do miejsca karmienia i pojenia. Nie ma problemów z przywołaniem ich z dachu gołębnika do gołębnika.*	
Codzienne obloty gołębi. *Ocena wizualna,*	*Gołębie ze sportową niecierpliwością oczekują na otwarcie wylotu. Widać wyraźne przepychanie się o dogodną pozycję na wylocie.* *Po otwarciu wylotu gołębie są pełne chęci do latania. Codzienny oblot może być dłuższy czasowo lub krótki. Nie jest to reguła, zależy głównie od hodowli. Ważne jest, aby nie były one leniwe.* *Gołębie latają w grupie przypominającą wojskową tyralierę, nadlatując nad gołębnikiem, zauważalny jest specyficzny ich potencjał, ich siłę oraz dźwięk skrzydeł.* *Czasami widać, jak jeden czy dwa gołębie rozrywają stado próbując samotnie dominować nad nim.* *Po krótkim locie gołębie lądują na dachu gołębnika, aby po kilku minutach powtórnie latać, cykl takiego zachowania może powtarzać się kilkakrotnie.*	
Treningi (powroty.) *Ocena wizualna,*	*U gołębi widać wyraźnie postęp i utrwalenie pozytywnych czasowych różnic w przylocie. Szczególnie widać to, kiedy wypuszczenie na trening odbywa się z tego samego miejsca.* *U gołębi powracających widać różnorodność kierunków przylotu (cenione są gołębie, które samodzielnie poszukują najkrótszej drogi do gołębnika.)* *Po otwarciu koszy, gołębie nie są zagubione, bardzo szybko obierają właściwy kierunek (szczególnie widoczne jest to przy słonecznym poranku).*	*Powracające gołębie nawet po kilku krótkich treningach, siadając na dachu gołębnika mają otwarte dzioby.* *Podstawowe przyczyny. Prawdopodobnie problemy z drogami oddechowymi, problemy z Trichomonozą, lub problemy z zatłuszczeniem organizmu. Po otwarciu koszy, gołębie są zagubione, wielokrotnie kołują, lub część z nich obiera niewłaściwy kierunek powrotu.* *Podstawowe przyczyny. Prawdopodobnie problemy z drogami oddechowymi, lub zaburzenie orientacji.(Gołębie w takim stanie, nie powinny być wkładane na lot.*
Wkładanie na lot. *Ocena wizualna,*	*Bez względu na metody lotowania, koszowane gołębie powinny zachowywać się spokojnie, nie powinny być w tym momencie nerwowe.* *Przy metodzie wdowieństwa, samce po włożeniu do koszy nie powinny wykazywać emocji seksualnych lub gruchać przez dłuższy okres czasu. Zachowanie takie może znacznie zakłócać spokój w koszu, osłabiać lub spotęgować optymalne napięcie emocjonalne.*	
Przylot, powrót z lotu. *Ocena wizualna, Ocena w rękach.*	*Brak oznak wyczerpania organizmu jak: zanik mięśni, ciemne nosówki, ostry mostek.* *Po powrocie do gołębnika, wyraźna pobudliwość seksualna, duża żywotność i ruchliwość.* *Duża motywacja do kontaktu w swoim terytorium, w gołębniku jak miska, samica, młódek, itp.* *Walka o pozycję i terytorium na wylocie.* *Gołębie po powrocie z lotu powinny mieć zapewniony odpoczynek, oraz niezachwiany, utrwalony codzienny rytm ich życia. Gołębie nie tolerują nagłych zmian w ich codziennym rytmie życia.*	*Gołębie powracają systematycznie, w grupie, lecz z znacznym opóźnieniem w stosunku do innych gołębi. Gołębie powracają w różnych okresach czasu, duże różnice czasowe pomiędzy poszczególnymi gołębiami.* *Podstawowe przyczyny: prawdopodobnie problemy z drogami oddechowymi, problemy z kokcydiozą, robaczycą lub zaburzenie orientacji (problemy z Mykoplazmozą).* *Działanie: analiza problemu, profilaktyka.*
Stan psychiczny, instynkt. *Ocena wizualna,*	*Buczenie: Poszukiwanie partnera, partnerki, miski lęgowej w celi gniazdowej.* *Ciąg do karmienia, ogrzania młódka w gnieździe.* *Ciąg do wysiadywania jajka.* *Buczenie: Tęsknota do miski lęgowej, celi lęgowej.* *Buczenie: Tęsknota do hodowcy (szczególnie widoczna u samic).*	*Brak zainteresowania gniazdem, partnerką, partnerem, zagubiony instynkt karmienia młódka.* *Podstawowe przyczyny: skutki niewłaściwego postepowania hodowcy lub oziębłość partnerki, partnera. Inne parzenie się.* *Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot.*

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora publikacji /Zbigniew Rzywucki, firma R-CERAM/Kod…/28.01.2019 /Strona. 4

Zachowanie się gołębi, w poszczególnych okresach ich życia.		
Łączenie w pary. *Ocena wizualna,*	*Gołębie w okresie łączenia w pary, nie powinny być wkładane na lot.*	*Przeczulenie nerwów, nadmierna pobudliwość nerwowa i hormonalna, niska kondycja samca i samicy. Okres „dziobania" nakłanianie samicy na gniazdo. Samica: w okresie rozwoju jajka, znaczne osłabienie organizmu. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot.*
Wysiadywanie jajek. *Ocena wizualna,*	*Powyżej 4 dni od chwili, po zniesieniu ostatniego jajka samica i samiec w dobrej formie lotowej. Powyżej 12 dnia wysiadywania jajka, samica i samiec w bardzo dobrej formie lotowej*	*Brak chęci do wysiadywania jajek (przeważanie zauważalne u samców). Porzucenie wysiadywania jajek, lub wyrzucenie jajek z gniazda. Podstawowe przyczyny: skutki niewłaściwego, z byt nerwowego postepowania hodowcy lub oziębłość partnerów. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot.*
Wyklucie się, pisklę do 1,5 tygodnia ich życia. *Ocena wizualna,*	*Samiec - zwyżka formy na 2/3 dni przed wykluciem się młodych. Samica w okresie tym, w wielu przypadkach: bardzo dobra forma.(Szczególnie w chłodniejsze dni.)*	*Od 1-4 dni po wykluciu wyraźny brak formy. Zmiana procesów metabolicznych. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot.*
Karmienie młódków w gnieździe. *Ocena wizualna,*	*Dobra forma lotowa i kondycja samic w okresie karmienia "papką". Czasami widoczny efekt zwracania papki, w czasie wkładania do kosza. Bardzo pozytywny efekt w chłodniejszą pogodę ,wskazuje na potencjalnie dobre wyniki lotowe.*	*Należy uważać na wkładanie samic na papce w czasie wysokich temperatur. Nigdy nie dawaj samca do kosza , kiedy karmiony młódek ma od 3- 6 dni, kumulowany w wolu pokarm ma negatywny wpływ na kondycje.*
Zrzucanie lotek. *Ocena wizualna,*		*Nigdy nie daje się na loty młodych gołębi przy zrzuceniu 5 lotki (duży wpływ na psychikę i osłabienie woli powrotu do gołębnika). Należy zakończyć wkładanie młodych gołębi na loty przy zrzuceniu 7 lotki. Efekt: osłabienie ogólne, duża strata energii, zaburzenie kształtowania stosin, lotek). Zbyt wczesne, nadmierne wypadanie lotek i piór okrywowych. Podstawowe przyczyny: Skutki niewłaściwego postepowania hodowcy z karmieniem i podawaniem witamin. Zbyt krótki okres pomiędzy lęgami. Rozpoczęcia następnego lęgu, w tym pędzenia na gniazdo i zniesienie jajek. Gołębie w takim stanie nie powinny być wkładane na lot. Pozostawić w domu.*

Powyższa tabela, zestawienie, opisuje wiele charakterystycznych cech i zachowania się gołębi, które z pewnością są znane hodowcom. Także, nie wszystkie z wymienionych zachowań gołębi, jako wskaźniki kondycji muszą być zawsze analizowane i brane pod uwagę. Ważne w tym wszystkim jest to, aby być ciągle spostrzegawczym i wnikliwym obserwatorem w stosunku do swoich gołębi i gołębi z innych hodowli. W szczególności podczas wkładania gołębi na lot.

Poza omawianymi cechami, kluczem do sukcesów w lotowaniu, jest także przywiązanie gołębi do gołębnika i hodowcy, oraz zapewnienie gołębiom spokoju i bezpieczeństwa. Gołębie powinny bezpiecznie czuć się w gołębniku i poza nim, podczas codziennych oblotów wokoło gołębnika. Dach gołębnika oraz niebo wokoło gołębnika, nie może stać się obszarem zagrożenia dla gołębi. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, warto spróbować nauczyć się żyć pośród przyrody i wynikających z niej zagrożeń. Warto być wnikliwym obserwatorem i poznawać zwyczaje drapieżnego ptactwa żyjącego w okolicy. Aby ograniczyć ryzyko zagrożeń, należy określić pory roku, dnia, w których znajdzie się także czas dla gołębi, dla bezpiecznego codziennego ich oblotu i treningów.

Autor publikacji: *Zbigniew Rzywucki R-CERAM.*

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora publikacji /Zbigniew Rzywucki, firma R-CERAM/Kod…/28.01.2019 /Strona. 5